

## 印度抗癌药品安贝生坦副作用

随着其所需的影响，**安比生坦**可能会导致一些不良影响。虽然并非所有这些副作用都可能发生，但如果发生这些副作用，则可能需要医疗护理。

如果在服用安立生坦时出现以下任何副作用，请立即与您的医生联系：

比较普遍：手臂，手，小腿或脚部肿胀或肿胀、体重快速增长、手或脚刺痛、不寻常的体重增加或减少。

不常见：咳嗽、快速，不规则，冲击或竞速心跳或脉搏、发热、头痛、肌肉疼痛、眼睛和颧骨周围疼痛或压痛、喉咙痛、鼻塞或流鼻涕、胸部紧实、呼吸困难、不寻常的疲倦或无力。

发病率未知：腹部或胃部疼痛或压痛、胸痛、粘土色的凳子、黑尿、尿量减少、食欲下降、扩张的颈静脉

极度疲劳、呼吸不规则、脸上，眼皮，嘴唇，舌头，喉咙，手，腿，脚或性器官上的大的蜂巢状肿胀、食欲不振、恶心和呕吐嘈杂，响亮的呼吸、皮肤苍白、皮疹，瘙痒、休息时呼吸困难、用劳累呼吸困难、黄色的皮肤或眼睛。

如果在服用安贝生坦时发生以下任何过量症状，请立即获得紧急救助！

过量的症状：模糊的视野、混乱、突然从躺卧或坐姿起床时头晕，晕眩或头晕、出汗。

安贝生坦可能会出现一些副作用，通常不需要医疗照顾。随着身体对药物的调整，这些副作用可能在治疗过程中消失。此外，您的医疗保健专业人员可能会告诉您有关预防或减少这些副作用的方法。

更多安贝生坦药物作用，请关注：[http://www.apolopharmacy.com/product\\_show-58.html](http://www.apolopharmacy.com/product_show-58.html)